

NO	薬剤名 効能・効果	色・形・記号	起 朝 昼 夕 寝					注意事項
			起	朝	昼	夕	寝	
1	ガスター錠 20mg 胃粘膜のヒスタミン2受容体を遮断し、胃酸分泌をおさえます。通常、胃・十二指腸などの潰瘍や胃炎、食道炎などの治療に用いられます。	白色～微黄白色の錠剤、直径8.1mm、厚さ4.0mm (表) ガスター20mg、社マーク117、20mg、(裏) ガスター、20mg、社マーク		1	1	1		1日3回毎食後に14日分 1日3回上記量
2	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (医療用) この薬は漢方薬です。あなたの症状や体質に合わせて処方してあります。アレルギー性鼻炎の鼻水、くしゃみ、鼻づまりやアレルギー性結膜炎のなみだ目などの症状を改善します。気管支喘息の喘鳴、呼吸困難、せきを和らげます。かぜの引き始めの鼻水、くしゃみや気管支炎のせきなどの症状を和らげます。通常、喘鳴、咳嗽、呼吸困難、鼻症状などに用いられます。	顆粒剤 (淡褐色) ももいろ帯に黒色のラインと黒字で ○に19		○			○	1日2回朝夕食後に14日分 (5g)
3	アクトネル錠 17.5mg 破骨細胞による骨吸収を抑えて、骨密度と骨強度を高め、骨折しにくくします。通常、骨粗鬆症の治療に用いられます。	淡紅色の錠剤、長径約8.1mm、短径約4.6mm、厚さ約3.3mm アクトネル 17.5mg AJ4		1	1	1		1日3回毎食後に10日分 1日3回上記量 この薬を含め、ビスフォスフォネート系薬剤を服薬中に、抜歯などの歯の治療を受けた場合に、あごの骨の異常がおこることがあるので、次の点について医師、薬剤師などから十分説明を受けてください。 ・医師と相談の上必要に応じて、服薬を開始する前に歯科検診を受け、出来るだけ抜歯などの治療を済ませてください。 ・服薬中は、歯科検診に行くなど口腔内を定期的にチェックしてください。 ・服薬中は、抜歯などの治療はできるだけお避けください。 ・服薬中は、ブラッシングなどで口腔内を清潔に保ってください。 ・歯科を受診する場合には、この薬を服薬中であることを歯科医師にお伝えください。