

NO	薬剤名 効能・効果	色・形・記号	朝 昼 夕 寝				注意事項
			朝	昼	夕	寝	
1	クラリシッド錠200mg 感染症の治療に用いるマクロライド系の抗生物質です。		1		1		他に服用している薬がありましたら、医師又は薬剤師にお申し出下さい。耐性菌の発生を防ぐため、途中で服用を中止せず、出された分は飲み切して下さい。
			1日2回朝夕食後に 1日分 1日2回上記量 全2錠				
2	PL配合顆粒 非ピリン系の総合かぜ薬です。解熱鎮痛薬や抗ヒスタミン薬など4つの有効成分の作用により、熱を下げ、頭、関節、筋肉、のどの痛みをやわらげ、鼻水・鼻づまりなどのかぜの症状を改善します。		○	○	○		眠くなることがあるので、自動車の運転や危険をともなう機械の操作は避けてください。飲酒により薬の作用や副作用が強まることがあります。
			1日3回毎食後に 1日分 1日3回上記量 全3g				
3	レフトーゼ錠(50mg)		1	1	1		1日3回毎食後に 1日分 1日3回上記量 全3錠
4	メジコン錠15mg 延髄にある咳中枢に直接作用し、咳反射を抑制して鎮咳作用を示します。通常、かぜ、気管支炎、肺炎などにもなう咳や、気管支造影、気管支鏡検査時の咳に用いられます。	白色 白色の錠剤(直径5.0mm、厚さ2.3mm) 表;メジコン15、裏;15015 メジコン15	1	1	1		眠くなることがあるので、自動車の運転や危険をともなう機械の操作は避けてください。
			1日3回毎食後に 1日分 1日3回上記量 全3錠				
5	ムコダイン錠250mg 気道粘液調整作用、粘膜正常化作用があり、たんや鼻汁を出しやすくし、鼻づまりをやわらげます。通常、上気道炎・急性気管支炎・気管支喘息・慢性気管支炎・気管支拡張症・肺結核の去痰や、慢性	白色の錠剤 直径:8.6mm、厚さ:4.5mm 表:ムコダイン錠250mg、K P-256 裏:MUCODYNE Tab. 250mg、ムコダイン250mg	1	1	1		1日3回毎食後に 1日分 1日3回上記量 全3錠
6	ムコスタ錠100mg		1	1	1		1日3回毎食後に 1日分 1日3回上記量 全3錠